

トップジンM[®]

水和剤

- ✓ **広い範囲**の植物の広い範囲の病気に、高い効果と**残効性**があります。
- ✓ **予防効果・治療効果**ともに優れます。
- ✓ **浸透移行性**に優れ、速やかに植物体内へ取り込まれ、植物体内に潜む病原菌を根本から退治します。
- ✓ 周りの植物にも安心・安全です。

トップジンM水和剤は作物(食用作物・花卉花木類等)に感染する広い範囲のうどんこ病・黒星病・灰色かび病や菌核病に対し、浸透移行性を有した高い防除効果と、長い残効性を発揮し、世界のプロの生産農家の信頼を得ています。

ポジティブリスト性の導入により、周辺作物への飛散でその作物に対する安全性が問題になっております。トップジンM水和剤は前段の通り広い作物に登録があり、安全性が担保されるため、飛散による不安が最小限に抑えられます。



商品名 トップジンM水和剤
 規格 箱(1g分包×10)×50
 寸法 個装:80×110×30
 幅×高さ×奥行 中装:シュリンクフィルムマルチ包装
 (mm) 外装:416×125×308
 希望小売価格 ¥641(本体価格¥610)
 JAN / ITFコード

これらの病害に!

ばら:うどんこ病

ばら:黒星病



きゅうり:うどんこ病

トマト:葉かび病

なす:灰色かび病



主要適用作物と病害

| 作物名 | 適用病害名 | 作物名 | 適用病害名 |
|-----------|------------------------------|---------|---------------------------------------|
| ばら | うどんこ病、黒星病 | はくさい | 白斑病 |
| きく | 褐斑病 | にら | 白斑葉枯病、乾腐病 |
| ゆり | 葉枯病、茎腐病 | ねぎ | 小菌核腐敗病、萎凋病 |
| さつき、つつじ | 褐斑病 | セルリー | 斑点病 |
| 花き類・観葉植物 | 菌核病 | せり | 葉枯病 |
| きゅうり | 菌核病、黒星病、炭疽病、うどんこ病、つる枯病、灰色かび病 | みつば | 菌核病 |
| トマト、ミニトマト | 葉かび病、菌核病、灰色かび病 | 食用ぎく | 褐斑病 |
| なす | 灰色かび病、黒枯病、菌核病 | かんしょ | 黒斑病 |
| いちご | うどんこ病、萎黄病 | ばれいしょ | 菌核病 |
| すいか | 炭疽病 | らっかせい | 黒渋病、褐斑病、灰色かび病、そうか病 |
| かぼちゃ | 白斑病 | だいず | 菌核病、紫斑病 |
| オクラ | 葉すす病 | かき | 炭疽病、落葉病、うどんこ病 |
| えんどうめ | 褐紋病、褐斑病、灰色かび病 | ぶどう | 白紋羽病、黒とう病、灰色かび病、褐斑病、うどんこ病、晩腐病、芽枯病、苦腐病 |
| さやえんどう | 褐紋病、褐斑病、灰色かび病 | キウイフルーツ | 果実軟腐病 |
| レタス | ビッグベイン病、菌核病、灰色かび病 | いちじく | 黒かび病、そうか病、株枯病 |
| 非結球レタス | 菌核病、灰色かび病 | 樹木類 | 炭疽病 |
| キャベツ | 菌核病 | | |

希釈倍数はパッケージ内の使用説明書をご覧ください。